



**Numéro 57**  
11 mai 2016



### COLZA :

- Ravageurs
- Fongicides

### BLE :

- Maladies

### MAIS :

- Désherbage

### AUTRES CULTURES

## COLZA

stade : G2 à G4

### ▲ Sclérotinia

La plupart des parcelles a engagé la défloraison. Aujourd'hui, si la protection fongicide n'a pas été relayée, il est trop tard.

Une intervention n'est donc plus justifiée.

### ▲ Ravageurs

Les pluies prévues cette semaine vont probablement limiter l'activité du charançon des siliques qui a été un peu plus observé la semaine dernière.

➤ Seuil d'intervention charançon : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 au stade G4 (10<sup>ères</sup> siliques bosselées).

➤ Produits utilisables avec mention abeille : KARATE ZEON 0,05 l/ha, KARATE XPRESS 0,1 l/ha... (Produits également homologués contre les pucerons cendrés).

### ▲ Pucerons cendrés



Des colonies sont toujours observées dans certaines parcelles. Les conditions climatiques actuelles sont propices à leur développement.

➤ Seuil d'intervention : 2 colonies/m<sup>2</sup> jusqu'à la fin du stade G4 (10 premières siliques bosselées).

➤ Produits utilisables avec mention abeille : KARATE ZEON 0,075 l/ha, KARATE XPRESS 0,15 l/ha...

Surveillez la présence d'auxiliaires qui pourrait aider à contrôler les populations de pucerons (coccinelles, syrphes...)



**Conditions d'utilisation des insecticides sur colza** : préférer le soir en absence d'abeilles avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures < 13° C. Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

## BLE

stade : DFP à dernière feuille étalée

### ▲ Maladies

Au vu des pluies prévues cette semaine, l'ensemble des blés doit être sous protection pour éviter des contaminations de septoriose sur les 3 dernières feuilles.

Les fongicides ont une action préventive, une protection après une contamination ne protégera pas votre feuille.

Dans la plupart des parcelles la dernière feuille est sortie mais souvent pas encore étalée. Une protection en fin de semaine, si un créneau météo le permet, peut paraître optimale pour les blés qui arrivent en fin de persistance dans le courant de la semaine. Pour le choix des produits et des doses : voir nos préconisations ci-dessous.

La rouille jaune semble repartir dans certaines variétés sensibles (ex. : ALIXAN). La plupart des produits de T2 contient une triazole qui fonctionne bien sur rouille jaune. Sauf grosse pression rouille (ronds actifs et spores importants), un renfort avec une strobilurine (ACANTO, AMISTAR) paraît peu rentable.

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 14 du 10 mai 2016. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du nord du département de Seine-et-Marne.

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le guide Culture Info.plaine - Interventions de printemps 2016. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Sébastien PIAUD  
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66  
Yohann JOURDIN  
01 64 79 30 53 / 07 78 24 48 86

### Pôle Agronomie et Environnement

418 Rue Aristide Briand  
77350 LE MEE SUR SEINE  
Tél : 01 64 79 30 65  
Fax : 01 64 37 17 08  
www.ile-de-france.chambagri.fr

Avec le soutien financier de :



OPE.COS.ENR15 01/09/15

## Protection fongicide

Stade	Situation	Préconisations
Dernière feuille déployée ou étalée	T2 avancé déjà réalisé	Attendre le stade gonflement – épiaison, en fonction de la météo.
	Toutes les autres	<b>Si ce n'est déjà fait, prévoir d'intervenir dès que possible :</b> ADEXAR 0,8 l/ha AVIATOR XPRO 0,6 l/ha LIBRAX 0,7 l/ha Si présence de rouille brune: CERIAX 0,9 l/ha VARIANO XPRO 1 l/ha

**Conditions d'utilisation des fongicides :** Intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15 - 20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

### MAIS

Lévée 2-3 feuilles

#### ➤ Désherbage

Les maïs sont en cours de levée voir déjà à 3 feuilles.

Les désherbages de post-levée peuvent démarrer. Il y a deux types de produits, les racinaires utilisés en prélevée qui peuvent être utilisés en post-levée précoce, et les produits de post classique à action racinaire et foliaire. Attention les produits de prélevée étant racinaires, ont peu d'impact sur des adventices déjà levées.

Produits possibles :

Post-précoce (1-2 feuilles)			Post (2-3 feuilles)		
Problématique graminées principalement	DUAL GOLD SAFENEUR 1,4 l*	Renfort dicots PAMPA 0,4 l	Flore dicots classique	ELUMIS 0,4 l	
	MERCANTOR GOLD 1,4 l*			CALLISTO 0,3 l + PAMPA 0,4 l (+ EMBLEM FLO 0,2 l ou PEAK 10 g)	
	ISARD 1,2 l			LAUDIS WG 0,2 l + PAMPA 0,4 l (+ PEAK 10 g)	
Problématique dicots principalement	CAMIX 2,5 l			MONSOON ACTIVE 0,75 l (+ EMBLEM FLO 0,2 l)	
	ADENGO 1,5 l*				

\* : attention 1 application maximum par an.

Spectre des renforts dicots :

	gaillet	géranium	mercuriale	pensée	Renouée oiseaux	Renouée liseron	Véronique perse
EMBLEM FLO	++	=	++	++	++	++	+++
PEAK	+	++	+	=	+++	++	+
KART	+++	=	+	=	+	++	=
CAMBIO	++	+++	=	=	=	++	++

### AUTRES CULTURES

#### ➤ Orge d'hiver

Les orges d'hiver sont normalement sous protection, pas de bio-agresseur pour le moment.

#### ➤ Orge de printemps

Les désherbages dicots sont à réaliser selon votre cible de 1 cm à 2 nœuds. Il est encore trop tôt pour démarrer les programmes fongicides ou régulateurs. Surveillez toujours les pucerons pour les orges les moins avancées.

### ▲ Pois et féveroles de printemps

Fin du risque sitone dans la plupart des cas. Surveillez les pucerons verts dans vos parcelles ont remonte quelques présences faibles pour l'instant.

### ▲ Pois et féveroles d'hiver

Les maladies sont peu présentes pour l'instant ou cantonnées aux feuilles basses. Les pluies de cette semaine pourraient favoriser la remontée de ces maladies dans les étages supérieurs. Si vous n'avez pas encore démarré votre protection, un passage de BANKO 500 1-1,5 l est suffisant. Autrement un relai en AMISTAR 0,4 l est suffisant sur ascochytose, maladie principale.

### ▲ Betterave

Avec les pluies, les adventices vont relever. La reprise des herbicides est donc nécessaire, d'autant que les pluies seront favorables aux produits racinaires.

## VISITE d'ESSAIS le JEUDI 2 JUIN 2016

### Visite de la plateforme d'essais à Aubepierre-Ouzouer-le-Repos

Réservez dès aujourd'hui dans votre agenda **le jeudi 2 juin 2016**

Pour participer à la visite des essais de la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. L'équipe des conseillers du Pôle Agronomie et Environnement vous proposera différents ateliers techniques : variétés blé, variétés colza, fongicides (nouveaux produits, biocontrôle), outils de pilotage de l'azote, matériels de modulation et de localisation de l'engrais...  
Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation.

## N-TESTER

La Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne vous propose de raisonner vos apports d'azote de fin de cycle à l'échelle de la parcelle avec l'outil d'aide à la décision N-Tester.

Nous nous déplaçons sur vos parcelles pour réaliser les mesures : un diagnostic au champ en pinçant 30 feuilles, répété 4 fois, pour déclencher ou non un apport complémentaire d'azote.

Le pilotage N-Tester® permet de mieux ajuster votre fertilisation azotée par rapport à la mise en œuvre de la méthode du bilan et ainsi de concilier rentabilité et respect de l'environnement.



Retrouvez les conditions, tarifs et bon de commande en cliquant sur le lien suivant.  
<http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-oad>

## PAC

### ▲ Déclaration 2016

Par une note communiquée le 4 mai dernier, le ministère de l'Agriculture a apporté des précisions quant au report des télédéclarations. Ainsi, même si les exploitants agricoles ont jusqu'au 15 juin pour télédéclarer, **l'ensemble des obligations liées à un début d'engagement en 2016** en faveur de **l'Agriculture Biologique ou en MAEC** reste à respecter à compter du **15 mai 2016**, pour une durée de 5 ans (jusqu'au 14 mai 2021).

### ▲ Paiement 2015 : Avance de Trésorerie Remboursable n° 3


Comme l'a annoncé le ministre de l'Agriculture par communiqué de presse, le versement pour les premiers volets de l'ATR 3 est effectif depuis la fin de semaine dernière pour tous les agriculteurs. Les aides concernées par ce versement sont les aides couplées végétales (chanvre, fécule, protéagineux, ...), l'assurance récolte, les aides à destination de l'agriculture biologique et le supplément pour les JA.

Les paiements ATR 3 pour les **MAEC interviendront fin mai**. Mais ils arriveront seulement à partir de **juillet pour les bénéficiaires des MAET « eau » en reconduction ou les MAE Natura 2000**.

## COMPOSITION DES PRODUITS CITES

Produits commerciaux	Matières actives et concentrations
<b>FONGICIDES</b>	
BANKO 500	Chlorothalonil 500 g/l
ACANTO	Picoxystrobine 250 g/l
AMISTAR	Azoxystrobine 250 g/l
<b>HERBICIDES</b>	
DUAL GOLD	S-metolachlore 915 g/l + benoxacor 45 g/l
MERCANTOR GOLD	S-metolachlore 960 g/l
CAMIX	S-metolachlore 400 g/l + benoxacor 20 g/l + mesotrione 40 g/l
ADENGO	Isoxaflutol 50 g/l + thiencarbazonne 20 g/l
ELUMIS	Mesotrione 75 g/l + nicosulfuron 30 g/l
CALLISTO	Mesotrione 100 g/l
PAMPA	Nicosulfuron 40 g/l
EMBLEM FLO	Bromoxynyl 401 g/l
PEAK	Prosulfuron 750 g/kg
LAUDIS WG	Tembotrione 200 g/kg
ISARD	Dimethenamide 720 g/l
MONSOON ACTIVE	Foramsulfuron 30 g/l + thiencarbazonne 10 g/l
<b>INSECTICIDES</b>	
KARATE XPRESS	Lambda-cyhalothrine 5 %
KARATE ZEON	Lambda-cyhalothrine 100 g/l



Retrouvez les bulletins Info.pl  line, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.  
 La Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. **Toute rediffusion et reproduction interdites**

