



Numéro 69
5 août 2020



BETTERAVE

- Maladies
- Enquête virose

COLZA

- Implantation
- Désherbage

ENQUETE RECOLTE

RESULTATS D'ESSAIS

- Variétés BTH du Sud 77
- Variétés BTH du Centre 77
- Variétés BTH en PI du Centre 77

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 25 du 04/08/2020. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Culture Info. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VAN CRANENBROECK
07 79 99 53 40

Service Agronomie

418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avant la contribution financière de l'Etat, le département de Seine-et-Marne a financé ce service d'accompagnement agricole et rural.

BETTERAVE (stade 100 % de couverture)

Cercosporiose : s'adapter au contexte

Etant donné la présence importante de jaunisse dans les parcelles, le potentiel de rendement est à prévoir à la baisse et l'investissement fongique également.

Plusieurs situations sont possibles :

- Si l'intervention n'est toujours pas réalisée, principalement en situation non irriguée, intensives, la cercosporiose est à prévoir.
- Si le T1 a été réalisé, la cercosporiose est à prévoir en fonction de la date de renouvellement de la culture.
- Si le T1 a été réalisé, la cercosporiose est à prévoir en fonction de la date de renouvellement de la culture.

RESERVE AUX ADHERENTS

➤ Rappel des seuils d'intervention :

Maladies	T1	T2
Cercosporiose	1 ^{ers} symptômes	20 %
Ramulariose	5 %	20 %
Oidium	15 %	30 %
Rouille	15 %	40 %



Adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les rotations.

Conditions d'utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

RAPPEL ENQUETE VIROSE BETTERAVES

Afin de permettre une analyse technique de la virose sur betterave, nous vous proposons de répondre à une enquête (cliquer sur le lien ci-dessous).

Les résultats vont nous permettre d'alimenter le débat sur les points techniques, économiques, environnementaux...

Elle est anonyme et juste localisable par la petite région naturelle dont vous dépendez.

Merci d'avance pour votre contribution.

[LIEN enquête virose betteraves](#)



Symptômes de jaunisse sur feuille (CARIDF)

Implantation**Date de semis : faut-il semer dans le sec ?**

Les conditions actuelles de semis sont défavorables à une levée rapide. Le sec quasi permanent depuis 2 mois a totalement desséché les sols, même en profondeur. Les travaux du sol restent difficiles, voire impossibles, en particulier sur les terres non déchaumées.

Les prévisions météo ne sont pas non plus réjouissantes avec l'absence de pluies pour les prochains jours.

Que faire ?

- Ne pas trop travailler le sol pour éviter un dessèchement encore plus important.
 - Attendre de meilleures conditions et essayer de profiter des rares passages orageux pour semer. Le créneau du 10-20 août reste idéal pour rechercher de la vigueur au démarrage et favoriser la croissance des colzas.
- Si vous décidez de semer sans prévision de pluies significatives, le risque principal est une pluie de 4-5 mm suivie à nouveau de sec qui aurait pour effet de faire germer les graines puis dessécher les germes. Dans ce cas, investissez au minimum dans les semences (choisir des semences de ferme en lignées) et le désherbage car le scénario sec risque de se prolonger.
- Les semis peuvent se réaliser jusqu'au 5-10 septembre. Cependant, cette stratégie nous amène à prendre un risque vis-à-vis des altises déjà très actives.

Densité de semis

➤ L'objectif est d'avoir...

RESERVE AUX ADHERENTS**Vigilance aux altises**

Afin d'éviter au maximum les mêmes attaques d'altises que l'an dernier, il est important de mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire :

- Un semis précoce ;
 - Un roulage au semis afin de favoriser un maximum de contact terre-grain et essayer d'avoir une levée homogène ;
 - Un engrais starter ou apport de matière organique permet de booster les colzas au départ et d'arriver au stade 4 feuilles plus rapidement ;
 - Les colzas associés, notamment avec de la féverole, ont montré des attaques moins importantes les précédentes années ;
 - Si un traitement s'avère nécessaire, privilégier une intervention en soirée. En effet, l'altise d'hiver est active principalement dans les premières heures qui suivent la tombée de la nuit. Il conviendra aussi de réaliser les traitements avec un volume de bouillie à 150 l/ha minimum car les insecticides sont des produits de contact ; on cherche donc à augmenter le nombre d'impacts pour toucher un maximum d'individus.
- Vérifier la présence de cet insecte en installant une cuvette jaune enterrée dès la levée.

Désherbage

Habituellement, le colza...

RESERVE AUX ADHERENTS**Colza associé : conseil d'implantation**

- Réaliser les semis le plus tôt possible pour favoriser la croissance des plantes compagnes et augmenter leur sensibilité au gel.
- Implantation en simultané, en mélange avec la semence pour les graines de même densité que le colza (ex : colza + lentille). Cela économise un passage si le matériel le permet.
- En deux passages (car des graines de densité différente au colza), semer le couvert avant le colza. Ne pas attendre trop longtemps entre les deux semis pour ne pas détruire le couvert et éviter que l'association ne prenne le dessus sur le colza.

Sélectivité des herbicides**RESERVE AUX ADHERENTS**

RESULTATS D'ESSAIS

 Variété blé tendre d'hiv

 RESERVE AUX ADHERENTS

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !

Vous êtes exploitant agricole et **votre Certiphyto sera échu en mars 2021** ? La Chambre d'agriculture vous propose renouveler votre Certiphyto dès septembre pour être tranquille par la suite. Alors ne perdez pas de temps et bénéficiez des meilleures conditions de formation :


Mardi 1 ^{er} septembre 2020	91150 ETAMPES
Jeudi 3 septembre 2020	78730 ST ARNOULT-EN-YVELINES
Vendredi 4 septembre 2020	77100 MEAUX
Lundi 7 septembre 2020	78200 MAGNANVILLE
Mardi 8 septembre 2020	95000 CERGY
Mercredi 9 septembre 2020	77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS
Jeudi 10 septembre 2020	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Lundi 14 septembre 2020	91150 ETAMPES
Mardi 15 septembre 2020	91830 AUVERNAUX
Mercredi 16 septembre 2020	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Vendredi 18 septembre 2020	78490 GALLUIS
Lundi 21 septembre 2020	77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 22 septembre 2020	78200 MAGNANVILLE
Mercredi 23 septembre 2020	77140 ST PIERRE-LES-NEMOURS
Jeudi 24 septembre 2020	91150 ETAMPES

Si votre Certiphyto n'est pas renouvelé dans les temps, il faudra le repasser en tant que primo-accédant par 2 jours de formation avec un test final.

Gagnez du temps et inscrivez-vous directement sur le site de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France : [Inscription en ligne](#)

Pour plus d'informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto),
01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr



Retrouvez les bulletins info.pl , les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites.