



**Numéro 108**  
19 mai 2021



**COLZA**  
- Fongicide

**BLE**  
- Fongicide

**POIS D'HIVER**  
-Fongicide  
-Pucerons

**ORGE DE PRINTEMPS**  
- Fongicide  
- Régulateur

**BETTERAVES**  
-Antigraminées  
-Pucerons

**MAIS**  
-Désherbage

**AIDE SECHERESSE MAÏS**

*Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 13 du 18/05/2021. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures 2020-2021. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.*

Document rédigé par :

**Louise VANCRANENBROECK**  
07 79 99 53 40  
**Alexis CAULIER**  
07 86 97 30 58

**Service Agronomie**  
418 Rue Aristide Briand  
77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Tél. : 01 64 79 30 75  
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

## AGROMETEO

Bilan météorologique des 7 derniers jours (source : Réseau CARIDF Sencrop)

	Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux	Saint-Cyr-sur-Morin	Basseville
Cumul de Pluviométrie et températures moyenne	24,8 mm 10,8°C	26,5 mm 10,4°C	28,3mm 10,2°C

Les températures sont froides pour la saison avec une moyenne de 10°C sur les derniers jours. Les prévisions de cette semaine sont similaires, avec notamment des températures nocturnes autour de 3 à 5°C.

Les céréales évoluent assez lentement avec une dernière feuille longue à se déployer. Les protéagineux continuent leurs progressions en biomasse et en floraison. En revanche les betteraves et les maïs souffrent de ce temps froid avec des stades calés depuis maintenant une semaine.

Le temps humide est particulièrement propice à l'installation et à la progression de la septoriose. Le positionnement du T2 est vivement conseillé si cela n'est pas déjà fait.

Les colzas entament eux leur défloraison. La présence de pucerons cendrés est signalée sur le secteur.

## A VOS AGENDAS !

**Jeudi 20 mai** : tour de plaine à 14 h chez Hugues Hincelin, Ferme des Aigrefoins à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Au programme : actualités des cultures et visites de parcelles de maïs et betteraves en strip-till.

**Jeudi 27 mai** : tour de plaine à 14 h chez Vincent Marichal, EARL de Bellevue à Verdelot. Au programme : actualités des cultures et visites d'essais sur la gestion d'un couvert permanent de trèfle et de luzerne dans une parcelle de blé.

### SAVE THE DATE

- Visite de la **PLATEFORME D'ESSAIS CARIDF/VALFRANCE** le mardi 8 juin située au PLESSIS-I'EVEQUE /IVERNY
- Visite de la **PLATEFORME D'ESSAIS CARIDF** le mardi 15 Juin située à Champcenest

## COLZA

(G2 à G4)

### Protection fongique

Les colzas ont pour la plupart entamé leur défloraison accélérée par le vent et la pluie. Ils doivent maintenant être sous protection fongique, avec un second passage à placer selon les stades, la durée de la floraison et le potentiel de rendement.

## Notre conseil :

- Pour les  
floraison  
Produit

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**

### 🚩 Ravageurs

Les conditions actuelles ne sont pas favorables à l'activité des charançons des siliques. Des interventions ont pu avoir lieu la semaine dernière. Il n'est pas nécessaire d'intervenir une seconde fois.

**BLE**

**(DFP- Gonflement)**

### 🚩 Maladies

🚩 **Septoriose:** Intervenir au stade DFE dès que les conditions le permettent

- Rappel des variétés sensibles et moyennement sensibles: Apache, RGT Sacramento, Providence, Filon, Complice...

Au vu des pluies importantes de ces 7 derniers jours avec près de 30 mm cumulés, le risque de contamination septoriose est important. Pour le moment le froid maintient un état sanitaire satisfaisant avec peu de symptômes observés. Seules les F4 définitives et quelques F3 sont touchées mais en dessous des seuils d'intervention.

Il convient tout de même d'être vigilant. Le développement de la septoriose mais aussi des rouilles jaunes ou brunes pourraient rapidement progresser si les températures augmentent.


La plupart des parcelles vont pouvoir recevoir l'application fongicide afin de prévenir la montée de la septoriose et la protection vis-à-vis de la rouille brune ou de la rouille jaune. Les modèles de prévisions conseillent l'application d'un T2 dès que les conditions le permettent.

- Attention : il est important de positionner le traitement lorsque qu'au moins 50 % de la parcelle est au stade dernière feuille étalée.
- Un délai de 2 h avant la pluie est nécessaire pour l'application des fongicides.
- Le T2 a une rémanence de 3 semaines.

Des taches physiologiques sont observées en parcelle. Ne pas confondre ces taches avec la septoriose. Les taches de septoriose présentent des pycnides noires au milieu de la zone touchée.

### 🚩 Préconisations selon le stade

🔒 **RESERVE AUX ADHERENTS**



\*\*\* Exemple de  
(TEBUCUR 250  
Tébuconazole p

Condition d'  
absence de v

### 🚩 Désherbage : antidiocots

Les conditions actuelles ne sont pas propices à l'utilisation des hormones. Attendre le retour de températures comprises entre 12 et 15°C en moyenne pour intervenir.

### 🚩 Maladies : Risque faible à moyen

Les stades avancent vite et la situation reste saine pour le moment malgré les précipitations.

Sensibilités variétales à la rhynchosporiose :

- Variété les plus tolérantes : RGT Planet, Laureate, KWS Fantex, RGT Orbiter.
- Variétés sensibles : Fandaga, Focus, Revanche,
- Variétés très sensibles : KWS Filante, KWS Irina, Liberta, Explorer, Sangria, Sebastian

### Notre conseil :

➤ En l'al

🔒 RESERVE AUX ADHERENTS

rhyn  
helm  
se  
V  
sens  
P  
Press

### 🚩 Régulateurs

➤ Si risque verse important (fort peuplement, excès d'azote...), appliquer le premier régulateur de croissance avant le 2<sup>ème</sup> nœud.

Sensibilité variétale à la verse :

- Peu sensible : KWS Irina, KWS Fantax
- Assez sensible : RGT Planet, Fandaga, Explorer, Sebastien
- Très sensible : Focus, Revanche

### Notre conseil :

➤ Produ

🔒 RESERVE AUX ADHERENTS

Conditio  
15-20° C

### Programme fongicide

Malgré les conditions climatiques, nous n'observons pas de montée de l'antracnose pour le moment. Avec la floraison en cours, les parcelles doivent maintenant être protégées.

#### Notre conseil :

Au vu des conditions

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

Maladie
Ascochyta

### Ravageurs : pucerons

Les premiers pucerons verts sont observés dans le secteur. Certaines parcelles peuvent avoir atteint le seuil indicatif de risque. La vigilance est donc de mise.

- Stade de sensibilité : à partir du stade floraison jusqu'à fin floraison + 2-3 semaines
- Seuils indicatifs de risque : avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs

Photo : CARDIF

A floraison : 10 pucerons/plante



Produit conseillé

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

\*Mention abeille : emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles.

### Rappel désherbage graminées : ray-grass - vulpins

Les graminées sont déjà bien présentes dans les parcelles. Pour assurer l'efficacité des produits il est important d'intervenir dès que les graminées sont à 3 feuilles.

Dose conseillée à adapter en fonction de la flore graminée ciblée :

➤

 **RESERVE AUX ADHERENTS**

➤

NB : 1  
antigr

Sur gr

### Rappel délais d'intervention

Cette intervention devra être réalisée entre deux désherbages antidicotylédones.

Rappel des délais : antidiots : **5 jours** ; antigraminées : **2 jours**

### **Ravageurs : pucerons**

Dans les parcelles où un resemis a dû être effectué (sans NNI), des premiers vols de pucerons verts sont observés dans certaines parcelles.


- Stade de sensibilité : 2 feuilles à couverture
- Seuil de nuisibilité : 10 % de plantes avec présence de pucerons verts.

Notre conseil :  **RESERVE AUX ADHERENTS**

## **MAÏS** (pointant à 3 feuilles)

Conditions difficiles pour les maïs qui peinent à se développer. Les températures moyennes et notamment nocturnes sont encore trop froides et limitent la croissance foliaire des maïs.

### **Rappel désherbage**

En situation de risque :  **RESERVE AUX ADHERENTS**

floramsulfuron

Produits conseillés

ACTIMUM

\* Ajouter

En situation

5-6 feuilles

Sur charbon

partir du stade

Conditions

l'humidité et

C et les gels

## **TOURNESOL** (cotylédons à 6 feuilles)

### **Ravageurs : pucerons**

Les premiers pucerons sont observés sur la culture. Le seuil indicatif de nuisibilité n'est pour l'instant pas atteint.

- Stade de sensibilité : levée à 10 feuilles formation du bouton floral.
- Seuil indicatif de risque : + 10 % plantes avec crispation ou 50 à 100 pucerons par plante de 5 paires de feuilles à bouton étoilé

Produit conseillé :  **RESERVE AUX ADHERENTS**



**BÉNÉFICIEZ DES AIDES EXCEPTIONNELLES SÉCHERESSE 2020 –  
volet 2 pour le maïs avant le 28 mai  
et pour la betterave avant le 3 juin 2021**


Le volet 2 du dispositif sécheresse 2020 décidé par la Région Ile-de-France pour soutenir les agriculteurs de la région, en réponse aux sollicitations de la Chambre d'agriculture aux côtés du syndicalisme, se met en place. Il se décline en 2 dispositifs distincts, avec des aides exceptionnelles de 150 000 € pour le maïs et 1 000 000 € pour la betterave.

Une aide destinée aux exploitations **produisant du maïs** (grain, ensilage, doux) ayant subi une baisse significative de leur rendement en 2020 par rapport au rendement de la période 2017-2019. Les critères pour l'octroi de l'aide seront arrêtés sur la base des dossiers reçus. L'inscription sera ouverte le 10 mai, avec une date limite de dépôt du dossier le 28 mai.

Une aide destinée aux **planteurs de betterave**. Ce dispositif vient en complément de l'aide apportée par l'Etat pour les exploitations ayant leur siège en Île-de-France. Le montant sera calculé sur la base de l'aide nationale, prenant en compte le plafond des minimis. L'inscription sera ouverte le 17 mai, avec une date limite de dépôt du dossier pour le 3 juin.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site internet de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France : [www.idf.chambre-agriculture.fr](http://www.idf.chambre-agriculture.fr) -> Rubrique « PILOTER SON ENTREPRISE » -> sous rubrique « AIDE RÉGIONALE SÉCHERESSE 2020 – volet 2 »



Retrouvez les bulletins Info.pl  Aine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures sur notre site Internet.  
*La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.*  
**Toute rediffusion et reproduction interdites.**