



Numéro 120
11 août 2021



BETTERAVES
- Fongicide T2

MAÏS
- Pucerons

RESULTATS ESSAIS
- Variétés Orge d'hiver
- Variétés Pois d'hiver
- Variétés Pois de printemps

Conseil collectif rédigé à partir de notre réseau d'observations en parcelles du début de semaine et du BSV Ile-de-France n° 25 du 10/08/2021. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du Nord du département de Seine-et-Marne. Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Guide Cultures 2020-2021. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.

Document rédigé par :

Louise VANCANENBROECK
07 79 99 53 40
Alexis CAULIER
07 86 97 30 58

Service Agronomie
418 Rue Aristide Briand
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 79 30 75
www.ile-de-france.chambagri.fr

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18

Avec le soutien financier de :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

À la sainte Claire, s'il éclaire et tonne, c'est l'annonce d'un bel automne.

ETAT DE LA PLAINE

Dans les parcelles de betteraves, la cercosporiose continue de se développer.

Dans les parcelles de maïs, nous commençons à observer sur plantes les 1^{ères} larves de pyrales dans les tiges malgré le traitement thricogramme.

BETTERAVE

(couverture)

Maladies

L'humidité et l'hygrométrie sont des facteurs favorables au développement de la cercosporiose dans les parcelles. Cette semaine la hausse des températures pourrait accélérer le développement de la maladie. Pour les parcelles qui ne sont pas sous protection T2, il est fortement recommandé d'envisager d'intervenir tout en respectant les seuils de déclenchement.

Les conditions climatiques étant très instables, il est recommandé de respecter les délais de couverture fongique et d'appliquer le deuxième fongicide 3 à 4 semaines après le 1^{er} passage.

➤ **Intervenir avec le second traitement fongicide 3 à 4 semaines après le T1**

➤ **Seuils indicatifs de risque T1 avant le 15 août :**

Maladies	T1	T2	T3
Cercosporiose	1 ^{ers} symptômes	20 %	25 %
Ramulariose	5 %	20 %	25 %
Oïdium	15 %	30 %	30 %
Rouille	15 %	40 %	40 %

Notre conseil :



RESERVE AUX ADHERENTS

Pour les
programmés

**Spirale
drainés av

*Cuivre
le secteur

La déroga
3 applica

Recomm
pluie ann

l'applica



Adapte

Conditions d'utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum

MAÏS

(stade floraison + 15 jours)


▲ Pucerons noirs (*Rhopalosiphum padi*)

La pression pucerons s'est légèrement atténuée avec la pluie, ce qui a été favorable à la fécondation. Les auxiliaires sont toujours présents ce qui devrait permettre d'éviter d'intervenir chimiquement.



RESERVE AUX ADHERENTS



Retrouvez les bulletins info.pl  Aline, les BSV de la région ainsi que les guides cultures sur notre site Internet.

La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Toute rediffusion et reproduction interdites.